


Exercices corrigés sur les rappels de logique du premier ordre

1- Analyser les formules suivantes (dire si ce sont des formules, donner arbres, occurrences libres, occurrences liées, identifier la portée de chaque quantificateur) :

- $(\forall x) ((\text{Dodec}(x) \vee \text{Devant}(x, y)) \Rightarrow ((\exists y) (\text{Cube}(y) \wedge \text{Derrière}(x, y)) \wedge \text{Entre}(u, y, x)))$
- $(\forall x) (\text{Dodec}(x) \vee \text{Devant}(x, y) \Rightarrow ((\exists y) (\text{Cube}(y) \wedge \text{Derrière}(x, y)) \wedge \text{Entre}(u, y, x)))$
- $(\forall x) (\text{Dodec}(x) \vee (\text{Devant}(x, y) \Rightarrow ((\exists y) (\text{Cube}(y) \wedge \text{Derrière}(x, y)) \wedge \text{Entre}(u, y, x))))$
- $(\exists x) (\exists y) (x \neq y \wedge (\forall w) (((w = x \vee w = y) \vee w = u) \Rightarrow (\forall z) \neg \text{Derrière}(z, w) \wedge \text{Devant}(x, u)))$
- $(\exists x) (\exists y) (x \neq y \wedge (\forall w) (((w = x \vee w = y) \vee w = u) \Rightarrow (\forall z) (\neg \text{Derrière}(z, w) \wedge \text{Devant}(x, u))))$

(a) arbre des sous-formules :



Commentaire :

- Toutes les occurrences de x sont liées (par $(\forall x)$)
- La première et la quatrième occurrences de y sont libres
- Les autres occurrences de y sont liées (par $(\exists y)$)
- La seule occurrence de u est libre


Si on veut éviter d'avoir une variable dont certaines occurrences sont libres et d'autres liées, on peut procéder à un renommage. On peut par exemple renommer toutes les occurrences liées de y par une nouvelle variable, par exemple z , et on obtient :

$$(\forall x) ((\text{Dodec}(x) \vee \text{Devant}(x, y)) \Rightarrow ((\exists z) (\text{Cube}(z) \wedge \text{Derrière}(x, z)) \wedge \text{Entre}(u, y, x)))$$

qui a le même « sens » que la formule originale (ceci ne pourra être vérifié que grâce à la méthode d'évaluation des formules par rapport à une structure). Dans cette nouvelle formule : x et z sont des variables liées (toutes leurs occurrences sont liées), y et u sont libres.


(b) : n'obéit pas à la syntaxe des formules, il manque des parenthèses, conséquence : ambiguïté de lecture, cf. $(A \wedge B \Rightarrow C)$ peut se lire $((A \wedge B) \Rightarrow C)$ ou $(A \wedge (B \Rightarrow C))$.

(c)



(d) manque également de parenthèses

(e) nous allons admettre que la négation porte sur la formule atomique



Toutes les occurrences de x et de y sont liées par un $\exists$. Celles de w et de z sont liées par un $\forall$. u est libre. Cette formule s'appliquerait donc à un objet u pour lequel il existe deux objets x et

y distincts tels que tout volume qui soit indifféremment x, y ou u ne soit derrière aucun objet, avec x devant u. (Essayer de dessiner une telle situation !)

2- Traduire les phrases suivantes :

a. *Seuls les grands volumes n'ont rien devant eux*

$$(\forall x)((\neg(\exists y)Devant(y, x)) \Rightarrow Grand(x))$$

b. *Si un cube a quelque chose devant lui alors il est petit*

$$(\forall x)((\exists y)((Cube(x) \wedge Devant(y, x)) \Rightarrow Petit(x))$$

c. *Si e est entre deux objets alors ils sont tous les deux petits*

$$((\exists x)(\exists y)Entre(e, x, y) \Rightarrow (Petit(x) \wedge Petit(y)))$$

d. *Tout dodécaèdre est au moins aussi grand que tout cube*

$$(\forall x)(\forall y)((Dodec(x) \wedge Cube(y)) \Rightarrow PGQ(x, y))$$

e. *Les seuls grands cubes sont b et c*

$$(\forall x)((Grand(x) \wedge Cube(x)) \Leftrightarrow ((x = b) \vee (x = c)))$$

f. *Au plus b et c sont de grands cubes*

[attention : dans cette dernière phrase, b et c peuvent très bien ne pas être de grands cubes !]

$$(\forall x)((Grand(x) \wedge Cube(x)) \Rightarrow ((x = b) \vee (x = c)))$$

g. *Tout cube en arrière d'un dodécaèdre est plus petit que lui*

$$(\forall x)(\forall y)((Cube(x) \wedge Dodec(y)) \wedge Derrière(x, y) \Rightarrow PPQ(x, y))$$

3- quelles sont les différentes lectures des phrases suivantes :

a. *trois déménageurs ont soulevé trois pianos*

On a le choix entre :

- à chaque déménageur correspondent trois pianos – d'où : au total 9 pianos !
- trois pianos correspondent au groupe de trois déménageurs pris collectivement – d'où : au total 3 pianos

La première interprétation est dite *distributive*

La seconde est dite *collective*

Noter qu'il est difficile d'imaginer des cas intermédiaires... Par exemple si deux déménageurs se mettent ensemble pour déménager 3 pianos et l'autre à lui tout seul en déménage 3, ce qui fait au total 6 pianos, il sera difficile de dire « trois déménageurs ont soulevé trois pianos » ! autrement dit, on ne mélange pas les deux types d'interprétation.

b. *mettre huit gouttes de médicaments dans trois cuillérées d'eau*

Cas semblable, mais plus amusant. Dans un cas, on a 24 gouttes et dans l'autre 8.

4- combien trouvez-vous de lectures différentes pour les phrases suivantes :

a. *chaque professeur a donné un livre à chaque étudiant*

Cette phrase comporte trois quantificateurs, portant sur trois variables différentes (pour respectivement un professeur x , un livre y , un étudiant z). Il y a deux $\forall$ et un $\exists$. A priori on peut prévoir les 6 permutations possibles :

$(\forall x)(\forall z)(\exists y)$, $(\forall z)(\forall x)(\exists y)$
 $(\forall x)(\exists y)(\forall z)$, $(\forall z)(\exists y)(\forall x)$,
 $(\exists y)(\forall x)(\forall z)$, $(\exists y)(\forall z)(\forall x)$

Mais on sait qu'il est possible de permuter sans dommage deux quantificateurs de même type qui se suivent, autrement dit les lectures $(\forall x)(\forall z)(\exists y)$ et $(\forall z)(\forall x)(\exists y)$ sont identiques, de même que $(\exists y)(\forall x)(\forall z)$ et $(\exists y)(\forall z)(\forall x)$. On obtient donc **quatre lectures** différentes :

- $(\forall x)(\forall z)(\exists y)$:
 $(\forall x)(\forall z)((\text{prof}(x) \wedge \text{étudiant}(z)) \Rightarrow (\exists y)(\text{livre}(y) \wedge \text{donne}(x, y, z)))$

Le livre donné dépend du professeur **et** de l'étudiant

- $(\forall x)(\exists y)(\forall z)$:
 $(\forall x)(\text{professeur}(x) \Rightarrow ((\exists y)\text{livre}(y) \wedge (\forall z)(\text{étudiant}(z) \Rightarrow \text{donne}(x, y, z))))$

Le livre ne dépend que du professeur

- $(\forall z)(\exists y)(\forall x)$:
 $(\forall z)(\text{étudiant}(z) \Rightarrow ((\exists y)\text{livre}(y) \wedge (\forall x)(\text{professeur}(x) \Rightarrow \text{donne}(x, y, z))))$

Le livre ne dépend que de l'étudiant

- $(\exists y)(\forall x)(\forall z)$:
 $(\exists y)(\text{livre}(y) \wedge (\forall x)(\forall z)((\text{professeur}(x) \wedge \text{étudiant}(z)) \Rightarrow \text{donne}(x, y, z)))$

Il y a un seul livre, que chaque professeur donne à chaque étudiant.

b. *chaque professeur a donné un livre à un étudiant*

Même raisonnement, il y a **quatre lectures** possibles, correspondant aux schémas $\forall\exists\exists$, $\exists\forall\exists$, $\exists\exists\forall$, $\forall\exists\forall$. (respectivement : le livre et l'étudiant dépendent du professeur, il y a un livre que tout professeur donne à un étudiant (l'étudiant dépend du choix du professeur), il y a un étudiant à qui chaque professeur donne un livre (le livre dépend du professeur), il y a un livre et un étudiant qui sont tels que chaque professeur donne ce livre à l'étudiant (toujours le même)).

c. *un professeur a donné un livre à un étudiant*

schéma $\exists\exists\exists$: une seule lecture.

d. *chaque professeur a donné chaque livre à chaque étudiant*

schéma $\forall\forall\forall$: une seule lecture.

5- idem pour les phrases :

a. *je n'ai pas donné quelque chose à quelqu'un*

Les ingrédients sont ici : une négation et deux quantificateurs existentiels, soit : $\neg, (\exists x), (\exists y)$. Admettons que x soit la chose et y la personne. Formellement on a les lectures :

- $\neg(\exists x)(\exists y)$:

$$\neg(\exists x)(\exists y)donne(je, x, y)$$

Il n'est pas vrai que j'ai donné quelque chose à quelqu'un, ou :
Je n'ai rien donné à personne

- $(\exists x)\neg(\exists y) :$
 $(\exists x)(\neg(\exists y)donne(je, x, y))$

Il y a quelque chose que je n'ai donné à personne

- $(\exists y)\neg(\exists x) :$
 $(\exists y)(\neg(\exists x)donne(je, x, y))$

Il y a quelqu'un à qui je n'ai rien donné

- $(\exists x)(\exists y)\neg :$
 $(\exists x)(\exists y)(\neg donne(je, x, y))$

Il y a une chose particulière et une personne particulière, je n'ai pas donné cette chose à cette personne.

b. *Marie n'a rien raconté à quelqu'un*

Cas semblable, on a le choix entre :

- $\neg(\exists x)(\exists y)a_raconté(Marie, x, y)$ ou $(\forall x)(\forall y)(\neg a_raconté(Marie, x, y))$
Marie n'a rien raconté à personne
- $(\exists y)\neg(\exists x)a_raconté(Marie, x, y)$ ou $(\exists y)(\forall x)(\neg a_raconté(Marie, x, y))$

Il y a quelqu'un à qui Marie n'a rien raconté

Les lectures :

$$(\exists x)\neg(\exists y)a_raconté(Marie, x, y)$$
$$(\exists x)(\exists y)(\neg a_raconté(Marie, x, y))$$

sont impossibles.

c. *Marie n'a raconté quelque chose à personne*

Cas semblable, on a le choix entre :

- $\neg(\exists x)(\exists y)a_raconté(Marie, x, y)$ ou $(\forall x)(\forall y)(\neg a_raconté(Marie, x, y))$
Marie n'a rien raconté à personne
- $(\exists x)\neg(\exists y)a_raconté(Marie, x, y)$ ou $(\exists x)(\forall y)(\neg a_raconté(Marie, x, y))$

Il y a quelque chose que Marie n'a raconté à personne

Les lectures :

$$(\exists y)\neg(\exists x)a_raconté(Marie, x, y)$$
$$(\exists y)(\exists x)(\neg a_raconté(Marie, x, y))$$

sont impossibles.

6- idem pour les phrases :

a. *Jean croit que quelqu'un le persécute*

Imaginons un prédicat du second ordre *CROIT*, alors on aurait :
CROIT(Jean, $(\exists x)persecute(x, Jean)$) ou bien :

$(\exists x)CROIT(Jean, per\ secute(x, Jean))$

La première lecture est dite *de dicto*, la seconde est dite *de re*.

b. *Jean croit qu'un professeur a donné un livre à chaque étudiant*

Très nombreuses lectures....

$CROIT(Jean, \exists p \exists l \forall)$ $CROIT(Jean, \exists p \forall \exists l)$ $CROIT(Jean, \exists l \forall \exists p)$
 $\exists p CROIT(Jean, \exists l \forall)$ $\exists p CROIT(Jean, \forall \exists l)$ $\exists l CROIT(Jean, \forall \exists p)$
 $\exists l CROIT(Jean, \exists p \forall)$ $\exists p \forall \exists l CROIT(Jean, donne(x, y, z))$ $\exists l \forall \exists p CROIT(Jean, donne(x, y, z))$
 $\exists p \exists l CROIT(Jean, \forall)$

$CROIT(Jean, \forall \exists p \exists l)$
 $\forall \exists p CROIT(Jean, \exists l)$
 $\forall \exists p \exists l CROIT(Jean, donne(x, y, z))$

Question ouverte :

Est-ce que $CROIT(Jean, (\forall x)P(x)) \approx (\forall x) CROIT(Jean, P(x))$?

Sinon, cela fait encore plus de lectures !

7- Traduire en logique des prédicats la phrase :

a. *Certaines puces sont telles que pour chacune d'elles nous pouvons en trouver une qui soit plus petite*

$(\exists X)(\forall x)(x \in X \Rightarrow (\exists y)(y \in X \wedge y < x))$

Remarque : dans cette formalisation, nous sommes obligés de dépasser le cadre de la logique du premier ordre puisque nous utilisons une variable d'ensemble X, ainsi que le symbole d'appartenance.

8- Traduire en logique des prédicats les phrases :

a. *Tout écrivain qui possède un chat écrit des romans*

$(\forall x)((\text{écrivain}(x) \wedge (\exists y)(\text{chat}(y) \wedge \text{possède}(x, y))) \Rightarrow \text{écrit_romans}(x))$

b. *Tout écrivain qui possède un chat aime passer du temps à le caresser*

• Attention :

$(\forall x)((\text{écrivain}(x) \wedge (\exists y)(\text{chat}(y) \wedge \text{possède}(x, y))) \Rightarrow \text{caresse}(x, y))$ ne marche pas !

(la deuxième occurrence de y est libre)

• Seule traduction possible :

$(\forall x)(\forall y)((\text{écrivain}(x) \wedge (\text{chat}(y) \wedge \text{possède}(x, y))) \Rightarrow \text{caresse}(x, y))$

9- Traduire en français usuel :

a. $(\exists x) (\exists y) (\exists z) (Cube(x) \wedge (Dodec(y) \wedge Tet(z)))$

Il y un cube, un dodécaèdre et un tétraèdre

b. $(\neg(\exists x) Grand(x))$

Il n'y a pas de grand volume, ou : aucun volume n'est grand

$$c. (\forall x) (\text{Dodec}(x) \Rightarrow (\exists y) (\text{Cube}(y) \wedge \text{Derrière}(x, y)))$$

Tout dodécaèdre est derrière un cube

$$d. (\forall x) (\text{Tet}(x) \Rightarrow (\exists y) (\exists z) \text{Entre}(x, y, z))$$

Tout tétraèdre est entre deux objets

$$e. (\forall x) (\forall y) (\forall z) (\text{Entre}(x, y, z) \Rightarrow \text{Plus_Grand_que}(x, y))$$

Tout objet est plus grand qu'un des objets entre lesquels il se trouve

$$f. (\exists x) (\exists y) (x \neq y \wedge (\forall w) ((w = x \vee w = y) \Rightarrow (\forall z) \neg \text{Derrière}(z, w)))$$

Il y a au moins deux objets qui n'ont rien derrière eux

$$g. (\forall x) (\text{Cube}(x) \Leftrightarrow (\exists y) (\text{Tet}(y) \wedge \text{Derrière}(y, x)))$$

Les cubes sont exactement les volumes qui ont derrière eux un tétraèdre

$$h. (\forall x) (\forall y) (\text{Plus_Grand_que}(x, y) \Rightarrow (\exists z) \text{Entre}(x, y, z))$$

Tout objet plus grand qu'un autre est entre cet autre et un troisième

$$i. (\neg(\forall x) (\forall y) (A_Gauche_de(x, y) \vee A_Droite_de(x, y)))$$

Il n'est pas vrai que tout couple d'objet soit tel que l'un soit forcément à gauche de l'autre

$$j. (\exists x) (\exists y) (\neg(\text{Devant}(x, y) \vee \text{Derrière}(x, y)))$$

Il y a des couples d'objets tels que l'un ne soit pas devant l'autre

10- Expliquer les différences entre :

$$a. (\exists x) (\text{Dodec}(x) \wedge \text{Grand}(x)) \text{ et}$$

$$b. (\exists x) (\text{Dodec}(x) \Rightarrow \text{Grand}(x))$$

(a) signifie : il y a un grand dodécaèdre. Elle est évaluée à « vrai » par rapport à toute structure où il y a un grand dodécaèdre.

(b) signifie : il y a un objet, si c'est un dodécaèdre, alors il est grand. Elle est évaluée à « vrai » en particulier par rapport à une structure où **il n'y a pas** de grand dodécaèdre (contrairement à (a)), mais aussi... par rapport à toute structure où il y a un volume qui **n'est pas** un dodécaèdre ! En effet, il suffit de prendre pour x ce volume-là, et alors nécessairement l'antécédent étant faux, l'implication est vraie.

On peut donc trouver une structure M qui soit un modèle pour (b) mais pas pour (a), ce qui suffit à prouver que ces deux formules n'ont pas la même signification. Toutefois,

chaque fois que (a) est vraie, (b) l'est aussi. En effet, s'il y a un grand dodécaèdre, pour prouver (b), il suffit de se placer dans le cas où x est justement ce volume-là.

ainsi qu'entre :

- c. $(\forall x) (\text{Tet}(x) \wedge \text{Petit}(x))$ et
- d. $(\forall x) (\text{Tet}(x) \Rightarrow \text{Petit}(x))$

(c) signifie que tous les objets du domaine sont des petits tétraèdres, alors que (d) signifie que tous les tétraèdres sont petits. Une structure M où tous les tétraèdres seraient petits mais où il y aurait également d'autres volumes rendrait vraie la formule (d) mais rendrait fausse la formule (c). Mais là encore, si (c) est vraie, alors (d) l'est nécessairement aussi.